


DELIRIUM-DEMÈNCIA



- 
- Els trastorns cognitius es defineixen per un dèficit clínicament significatiu de les funcions cognitives o la memòria, que representa un canvi del nivell previ d'activitat.
 - Destacar /Diferenciar dos tipus de trastorn per deteriorament cognitiu:
 - La Demència.
 - El Delirium.

DEMÈNCIES

- La més freqüent és la de tipus Alzheimer (60% de totes les demències), seguida per la Demència Vascular i altres d'etiologia múltiple (malaltia de Pick, malaltia de Parkinson, demència per alcohol,...).
- Es troba entre 2-5% en edats de 65-70 anys, augmentant fins a 20-30% en majors de 80 anys.
- Totes elles tenen unes característiques comuns:
 - Deteriorament cognitiu***
 - Estat emocional***
 - Alteració progressiva del llenguatge i psicomotricitat*** → *Alteració AVD i l.*

DELIRIUM

- És un síndrome transitori, destacant com a símptoma fonamental l'alteració de **l'estat de consciència i les funcions cognitives**.
- És un síndrome d'etiologia multifactorial (edat, lesions cerebrals, consum d'alcohol, intoxicació per fàrmacs,...)
- La característica més destacada és l'alteració de la consciència, que acompanya d'un canvi en les funcions cognitives, que NO és explicat per l'existència o desenvolupament d'una demència.
- Es pot presentar en forma de fluctuacions, poden aparèixer períodes de lucidesa amb altres de confusió.
- Presenten alteracions de la percepció (al·lucinacions visuals, cenestèsiques).
- Sol aparèixer en un curt període de temps (pot durar de minuts a setmanes).
- Pot conduir a la mort.



■ **Tractament**

No existeix un tractament específic del delirium fins que no es determina l'origen del mateix.

Fàrmacs antipsicòtics/neurolèptics.

■ **Atenció d'Infermeria**

Es tindrà cura de les necessitats alterades en funció de l'evolució i simptomatologia que presenti en cada moment. (AVD, control conductes, medicació, atenció familiar,...)

A decorative graphic consisting of a horizontal line with a gradient from light green to white. On the left side, there is a large black bracket '['. On the right side, there is a large yellow bracket ']'.

■ **Diagnòstics d'Infermeria relacionats:**

- Ansietat - Temor
- Trastorn de la identitat personal
- Insomni / Alt. del patró del son.
- Risc de violència vers un mateix/ els altres.
- Alteració de l'estat nutricional per excés/defecte.
- Dèficit d'autocura en la higiene, vestir-se.
- Coneixements deficients (en relació a la seva malaltia i tractament).
- Confusió crònica.
- Aïllament social.
- Interrupció dels processos familiars.

CARACTERÍSTIQUES	DELIRIUM	DEMÈNCIA
Inici	Agut	Insidiós
Duració	Dies o setmanes	Crònica
Curs al llarg del dia	Varia per hores o moments	Més estable al llarg del dia
Nivell de consciència	Fluctuant, confús	Normal
Desorientació	Molt intensa, precoç	No és precoç
Atenció	Molt alterada	Poc alterada la principi
Alt. de la percepció	Freqüents	Rarament
Afecte	Pors, ansietat, irritabilitat	Labilitat
Psicomotricitat	Alterada: hipo-hiperactiu	Més conservada
Adaptació al dèficit	Pobre	Relativament bona